Biologia Gallo-Hellenica 1969 2 (1): 65-67

NOTES FAUNISTIQUES

PSELAPHIDES BALKANIQUES

Par H. COIFFAIT

Au cours de la campagne 1967 de la Mission franco-hellénique en Grèce, un certain nombre de Coléoptères ont été récoltés dans l'humus et le terreau. J'ai fait connaître dans un précédent travail les Staphylinides contenus dans ces récoltes.

En ce qui concerne les *Pselaphidae*, n'étant pas spécialiste, j'ai préféré soumettre ce matériel à ma collègue, Mme Zora KARAMAN de Skopje, éminente spécialiste des *Pselaphidae* balkaniques. Je lui ai par la même occasion soumis un certain nombre de *Pselaphidae* que j'avais récoltés antérieurement au cours de missions dans la région méditerranéenne orientale.

Ce matériel s'est révélé fort intéressant puisque dans le mémoire ci-dessus, Mme KARAMAN décrit deux genres nouveaux et 6 espèces nouvelles.

Les genres nouveaux sont *Coiffaitius*, genre myrmécophile très modifié de la sous-famille *Clavigerinae* et le genre *Minitiola* de la sous-famille *Pselaphinae*, Tribu *Euplectini*, genre créé pour une forme minuscule d'Eubée.

Les espèces nouvelles sont :

— *Coiffaitius ispartae*, KAR. ; type: Environs d'Isparta, Anatolie centrale.
— *Minitiola eubeae*, KAR. ; type : Lichas, Ile d'Eubée.
— *Trimium graecum*, KAR. ; type : Karpenission, Eurytanie.
— *Amauronyx coiffaiti*, KAR. ; type : Dirfys, Ile d'Eubée.
— *Bythinus spartacus*, KAR. ; type : Tripi, Péloponnèse.
— *Bryaxis (Erichobythus) beroni*, KAR. ; type : Gouffre Galvanec, environs de Ledenika, Bulgarie (P. BERON leg.).

Outre ces nouvelles formes dans l'envoi que je lui ai fait, Mme KARAMAN a identifié les espèces ci-après :

Euplectus piceus MOTSCH., Karpenission, Eurytanie.
Plectophloeus nubigena REITT., Virtoape, Roumanie.
Trimium expandum REITT., Ile Strongyli, Grèce.

Trimium carpathicum SAULCY, Dirfys, Eubée.
Bithynus tener REITT., Karpenission, Eurytanie.
Bryaxis puncticollis DENNY, Moskanyci, Slovénie.
Bryaxis argus KR, Moskanyci, Slovénie.
Bryaxis corcyreus REITT., env. de Kerkyra, Corfou.
Brachygluta hipponensis SAULCY, Rhestoi, Dafni, Attique.
Tychus pullus KIESSW., Stiri, Péloponnèse.
Batrisodes oculatus AUBÉ, Mont Parnés, Attique.
Batrisodes clysius REITT., Nauplion, Péloponnèse.
Pselaphus caviventris REITT., Col de Vityna, Péloponnèse.

A cette liste, il convient encore d'ajouter les espèces ci-après récoltées par moi au cours de voyages antérieurs et déterminées par Cl. BÉSUCHET ou par moi-même :

Euplectus piceus MOTSCH., Karpenission, Eurytanie.
Scotoplectus capellae REITT., Planina, Slovénie.
Trimium merkli REITT., Celtici, Bursa, Turquie d'Asie.
— *karamani* REITT., Spalato, Dalmatie.
— *thessalonica* BL., Gôleük, Turquie d'Asie.
Brachygluta syriaca BAUDI, Chekka, Liban.
Tychus dalmatinus REITT., Plitvice, Croatie.
— *coiffaiti* BES., Alexandroupolis, Thrace.
— *longicornis* BES., Belgeix, Turquie d'Asie.
— *pullus* KIESSW., Darim Dag, Anatolie centrale.
Batrisodes clysius REITT., Grotte Alepotrypa, Pyrgos Dyrou, Sud du Péloponnèse, une série d'exemplaires sur des débris ligneux.
Pselaphaulax acuminatus MOTSCH., environs d'Afyon, Anatolie centrale.
Pselaphostomus mehadiensis FRIV., Eregh, Anatolie centrale.
Enoptostomus globulicornis MOTSCH., Darim Dag, Anatolie centrale.
Ctenistes palpalis REICHE, Gauziatsch, Turquie d'Asie.
Claviger merkli REITT., Isparta, Anatolie centrale.

Summary

List of *Pselaphidae* (Coleoptera) found in the humus and in the soil by french and greek missions in Greece (17 species), Turkey (10 species), Yougoslavia (5 species), Roumania (1 sp.), Bulgaria (1 sp.) and Lebanon (1 sp.).

Περίληψις

Κατάλογος τῶν Pselaphidae (Coleoptera) τῶν συλλεγέντων ἐντὸς τοῦ χούμου καὶ τοῦ ἐδάφους ὑπὸ τῶν γαλλικῶν καὶ ἑλληνικῶν ἀποστολῶν εἰς Ἑλλάδα (17 εἴδη), εἰς Τουρκίαν (10 εἴδη), εἰς Γιουγκοσλαυΐαν (5 εἴδη), εἰς Ρουμανίαν (1 εἶδος), εἰς Βουλγαρίαν (1 εἶδος) καὶ εἰς Λίβανον (1 εἶδος).

(Laboratoire de Zoologie, Faculté des Sciences de Toulouse,
Laboratoire souterrain de Moulis)